



REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

Executive agency for variety testing, field inspection and seed control

VARIETY DESCRIPTION

1. Справочен номер в ИАКАС
Reference number of Reporting Authority 4266/673.2016
2. Справочен номер на заявяващия орган
Reference number of Requesting Authority
3. Предложено наименование от автора
Breeder's reference BGT 1 (BT 6/15)
4. Заявител (име и адрес)
Applicant (name and address) Biogranum D.O.O.
Toplice Milana 20 , 21000, Novi Sad, Serbia
5. (а) Ботаническо име на таксона
(a) Botanical name of taxon xTriticosecale Witt.
(б) Код по UPOV
(b) UPOV code TRITL
6. Обикновено име на таксона
Common name of taxon Triticale
7. Наименование на сорта
Variety denomination BG Triamo 2S
8. Дата и номер на протокола на CPVO
Date and document number of CPVO report TP/121/1/, 16.02.2011
9. Дата и номер на методиката на UPOV или на сортоизпитващия орган
Date and/or document number of UPOV or Reporting Authority's test guidelines TG/121/3, 06.10.1989
10. Сортоизпитващ орган
Reporting Authority EAVTFISC, 125 Tsarigradsko Shosse Bl. Block 1, 1113 Sofia, Bulgaria
11. Опитна(и) станция(и)
Testing station(s) and place(s) Brashlen, Bulgaria
12. Период на изпитване
Period of testing 2017 - 2018
13. Дата и място на издаване на документа
Date and place of issue of document EAVTFISC
14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)
Group: (if characteristics of number 15 are used for grouping, they are marked with a G in that number)

CPVO No.	UPOV No.	Признаци <i>Characteristics</i>	Изява <i>States of Expression</i>	Бал <i>Note</i>	Забележки <i>Remarks</i>
6	6	Време на изкласяване: първото класче е видимо при 50% от растенията <i>Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of plants)</i>	рано до средно рано	4	
11	13	Стъбло: окосменост на шийката <i>Stem: density of hairiness of neck</i>	слаба <i>weak</i>	3	
16	19	Глума: окосмяване на външната повърхност (както при пр. 15) <i>Lower glume: hairiness on external surface (as for 17)</i>	няма <i>absent</i>	1	

20	25	Зърно: оцветяване с фенол <i>Grain: coloration with phenol</i>	средно <i>medium</i>	5	
21	26	Сезонен тип <i>Seasonal type</i>	алтернативен тип <i>alternative type</i>	2	

Справочен номер в ИАСАС
Reference number of Reporting Authority

4266/673.2016

15. Признаци, които са наблюдавани
Characteristics Included in the Reporting Authority's Test Guidelines

CPVO No.	UPOV No.	Признаци <i>Characteristics</i>	Изява <i>States of Expression</i>	Бал <i>Note</i>	Забележки <i>Remarks</i>
1	1	Плоидност <i>Ploidy</i>	хексаплоид <i>hexaploid</i>	6	
2	2	Колеоптил: антоцианово оцветяване <i>Coleoptile: anthocyanin coloration</i>	няма или много слабо <i>absent or very weak</i>	1	
3	3	Растение: тип на растеж <i>Plant: growth habit</i>	междинен <i>intermediate</i>	5	
4	4	Растение: честота на растенията с извит флагов лист <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	средна до силна	6	
5	5	Флагов лист: антоцианово оцветяване на ушичките <i>Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles</i>	силно <i>strong</i>	7	
6	6	G Време на изкласяване: първото класче е видимо при 50% от растенията <i>Time of ear emergence (first spikelet visible on 50% of plants)</i>	рано до средно рано	4	
7	7	Флагов лист: налеп на влагалището <i>Flag leaf: glaucosity of sheath</i>	много силен <i>very strong</i>	9	
8	8	Флагов лист: налеп на листната петура (отдолу) <i>Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)</i>	силен <i>strong</i>	7	
9	9	Прашници: антоцианово оцветяване <i>Anthers: anthocyanin coloration</i>	няма или много слабо <i>absent or very weak</i>	1	
10	12	Клас: налеп <i>Ear: glaucosity</i>	силен до много силен	8	
11	13	G Стъбло: окосменост на шийката <i>Stem: density of hairiness of neck</i>	слаба <i>weak</i>	3	
12	14	Растение: дължина (стъбло, клас и осили) <i>Plant: length (stem, ear and awns)</i>	късо до средно <i>short to medium</i>	4	
13	15	Клас: разпределение на осилите <i>Ear: distribution of awns</i>	изцяло осилест <i>fully awned</i>	3	
14	16	Осили на върха на класа: дължина <i>Awns above the tip of ear: length</i>	къси до средно дълги	4	
15	17	Глума: дължина на първия зъбец (в класче от средната третина на класа) <i>Lower glume: length of first beak (spikelet in mid-third of ear)</i>	дълго <i>long</i>	7	

16	19	G	Глума: окосмяване на външната повърхност (както при пр. 15) <i>Lower glume: hairiness on external surface (as for 17)</i>	няма <i>absent</i>	1	
17	20		Сламка: сърцевина в напречен разрез (по средата между основата на класа и възела на стъблото отдолу) <i>Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)</i>	средна до дебела	6	
18	22		Клас: плътност <i>Ear: density</i>	режав до среднопътен	4	
19	23		Клас: дължина без осилите <i>Ear: length excluding awns</i>	средно дълъг до дълъг	6	
20	25	G	Зърно: оцветяване с фенол <i>Grain: coloration with phenol</i>	средно <i>medium</i>	5	
21	26	G	Сезонен тип <i>Seasonal type</i>	алтернативен тип <i>alternative type</i>	2	

16. Подобни сортове и различия от тези сортове
Similar Varieties and Differences from These Varieties

°) В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.
In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size of the difference.

17. Допълнителна информация
Additional Information

(а) Допълнителни данни

(a) Additional Data

(б) Фотография (ако е приложима)

(b) Photograph (if appropriate)

(в) Версия на RHS цветната скала

(c) RHS Colour Chart version used (if appropriate)

(г) Забележки

(d) Remarks

18. Подпис
Signature